

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

B. Braun Melsungen AG - 34209 Melsungen, Duitsland

Nutriflex Omega special, 56 g/l Amino + 144 g/l G, emulsie voor infusie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Nutriflex Omega special en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat voedingsstoffen die aminozuren, zouten (elektrolyten) en vetzuren worden genoemd en die van groot belang zijn voor de groei of het herstel van het lichaam. Het bevat ook kalorien in de vorm van koolhydraten en vetten.

Dit middel wordt alleen voorzien van gegevens.

U krijgt dit middel wanneer u niet in staat bent om normaal te eten. Er zijn vele situaties waarin dit het geval kan zijn, bijvoorbeeld wanneer u herstelt van een chirurgische ingreep, letsel of brandwonden, of wanneer u geen voedsel kunt ophalen uit uw maag en darm.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor eieren, pinda's, sojabonen of vis.
- Dit geneesmiddel mag niet worden gegeven aan pasgeborenen, baby's en peuters jonger dan twee jaar.
- U mag dit middel gebruiken als u een van de volgende aandoeningen heeft:

 - overblijvende problemen met het bloedsomloop, zoals problemen die kunnen voorkomen als u in een toestand van shock verkeert
 - hartaanval of beroerte
 - ernstig verstoerde bloedstollingseigenschap, risico op bloedingen (ernstige coagulopathie, verergerende hemorrhagische diathesis)
 - ernstig verstoerde bloedstollingseigenschap door bloedstolsels of vet (emboleï)
 - ernstig verstoerde bloedstollingseigenschap door coagulopathie
 - ernstige galvoede zonder nieuwvangerende therapie
 - verstoringen van de samenvoering van uw lichaamszout
 - vochtverlies of te veel wacht in uw lichaam
 - vermindering longademoeidheid
 - ernstig hartfalen
 - bepaalde hartstilstandsoorzaken, zoals
 - te veel spieractiviteit in het bloed
 - afwezigheid afwijkingen van de aminozuurplossing
 - abnormale hoeveelheid bloedplaatjes waardoor meer dan 6 eenheden insuline per uur nodig zijn om de bloedplaatjes te onderdrukken te kunnen
 - afwijkingen van de stofwisseling die kunnen voorkomen na operaties of letsel
 - coma waarvan de oorzaak onbekend is
 - onterendekele beweer of zuurstof naar de weefsels
 - abnormal hoog zuurgehalte in het bloed

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

- U heeft een of meer allergieën.
- U heeft heftige beperkingen aan de stofwisselingstoornissen, zoals diabetes, abnormale vetwaarden in het bloed of verstoringen van uw vocht-, zout- of zuur-harselassen.

U zult nauwelijks in de gaten gehouden zodat vroege signalen van een allergische reactie (zoals koorts, bever, uitslag of kortademigheid) tijdig worden opgemerkt wanneer u dit geneesmiddel krijgt.

Verdere controles tests, zoals diverse onderzoeken van bloedafnemers, zullen worden aangewend om zeker te zijn dat uw lichaam de toegevoegde stoffen goed kan verdragen.

U berichtgevoerd in de gezondheidszorg zal eveneens maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw vocht en elektrolytengenote in orde zijn. Naast dit middel krijgt u nog andere voedingsstoffen zodat u alle behoeften blijvend kan blijven.

Kinderen

Dit geneesmiddel mag niet worden gegeven aan pasgeborenen, baby's en peuters jonger dan twee jaar.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik u nu een Nutriflex Omega special nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort gedownload of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabijheid toekomt ander geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Dit middel kan een wisselwerking vertonen met sommige andere geneesmiddelen. Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u een van de volgende geneesmiddelen innemt of krijgt:

- insuline
- heparine
- geneesmiddelen die ongewenste bloeding tegenstaan, zoals warfarine of andere couumarinederivaten
- geneesmiddelen die de sluier van urine stimuleren (diuretica)
- geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartproblemen (ACE-remmers en angiotensine-II-receptorantagonisten)
- geneesmiddelen die worden gebruikt bij organtransplantaties, zoals ciclosporine en tacrolimus
- geneesmiddelen voor de behandeling van ontstekingen (corticoïden)
- medicijnen die de bloedtoevoer hebben op uw voorhoofds (adrenocorticoïd hormoon) [ACTH].

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, doet u wat voor zwanger of heeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of heeft u absoluut noodzakelijkheid om voor uw herstel. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van dit medicijn.

Gebruik en het gebruik van machine

Dit geneesmiddel wordt normaal gegeven aan immobile patiënten, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of kliniek, waarbij het besturen van een vocht- en het gebruik van machines uitgesloten zou zijn. Het geneesmiddel zelf heeft echter geen effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Nutriflex Omega special bevast natrum

Dit middel bevat 771 mg natrum (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per zak van 625 ml. Dit komt overeen met 39% van de aanbevolen maximale dagelijke hoeveelheid natrum in de voeding voor een volwassene.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig en van mekenen per dag nodig heeft, vooral als u is aangeraden een zoutarm (natrum) dieet te volgen.

Heft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Dit geneesmiddel wordt toegevoegd met een intraveneuze infusie (droppeninfusie), dit wil zeggen via een klein buisje rechtstreeks in een ader. Dit geneesmiddel zal uitsluitend via een van uw grote (centrale) aders worden toegevoerd. De aanbevolen duur van infusie voor een parenterale voedingssok is maximaal 24 uur.

Uw arts of apotheker zal bepalen hoeveel u van dit geneesmiddel nodig heeft en hoe lang u met dit geneesmiddel moet worden behandeld.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en verlaagdheid bij kinderen in de leeftijd van 2 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Dit geneesmiddel mag niet worden gegeven aan pasgeborenen, baby's en peuters jonger dan twee jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van dit geneesmiddel heeft gegeten, is het mogelijk dat u last krijgt van een zogenoemd 'overbelastings-syndroom' of 'water- en elektrolytverzuim':

- stoomringen in de achter- en elektrontombolanen
- water in de longen (longoedeem)
- verlies van aminozuren via de urine en verstoord aminozuurbalans
- braken, misselijkheid
- hoofdpijn
- uitdroging
- sterke geconcentreerde lichaamslosstofjes (hyperosmolaliteit)
- verstoorde bestrijking of beweegingsvermoeidheid als gevolg van een extreem hoge bloedsuikerspiegel
- verstoring van de darmen (diarree)
- afzetting van vet in de leverducten (steatose)
- verlaagd aantal rode bloedcellen (leukopenie)
- verlaagd aantal witte bloedcellen (leucopenie)
- toename van oranje rode bloedcellen (reticulocytose)
- afbraak van bloedcellen (hemolyse)
- bloeding of neiging tot bloeden
- verstoorde bloedstolling (zoals teken zijn aan veranderingen in bloedingstijd, stollingstijd, protrombintijd enz.)
- hoge waterdruk in het bloed
- hoge zuurheid in het bloed
- verzuim

Als een van deze symptomen zich voordoet, moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet.

Vóór u begint: Wanneer u te veel van Nutriflex Omega special heeft gebruikt of van ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antitoxicum (070/245.245).

Heft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Indien een van de volgende bijwerkingen optreedt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts; hij/zij zal dit geneesmiddel bij u stopzetten:

Zoals u komt voor bij kinderen dan 1 op de 100 gebruikers:

- allergeen反応
- bloedverzuim
- huidontstekingen
- zwelling of huidaandoeningen

Andere bijwerkingen zijn:

Sans kom voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers:

- misselijkheid, braken, verminderde eetlust

Zoals kom voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers:

- toegenomen reuk van uw bloed tot stollen
- blaaswachting verkeerd van de huid
- koraatademigheid
- hoofdpijn
- droogheid van de huid (erythema)
- zweten
- koude rillen
- het koud hebben
- hoge afname temperatuur
- suifheid
- pijn in de borstkas, rug, botten of ter hoogte van de lendenen
- stijging of dalen van de bloeddruk
- abnormaal hoeveel vet in de leverfunctiontest
- verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie)
- verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie)
- verlaagd aantal rode bloedcellen (reticulocytose)
- toename van oranje rode bloedcellen (reticulocytose)
- afbraak van bloedcellen (hemolyse)
- bloeding of neiging tot bloeden
- verstoorde bloedstolling (zoals teken zijn aan veranderingen in bloedingstijd, stollingstijd, protrombintijd enz.)
- hoge waterdruk in het bloed
- hoge zuurheid in het bloed
- verzuim

Als een van deze symptomen zich voordoet, moet de infusie onmiddellijk worden stopgezet.

Vóór u begint: Wanneer u te veel van Nutriflex Omega special heeft gebruikt of van ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antitoxicum (070/245.245).

Heft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de wazier bewaren. Indien de zak per ongeluk werd ingevuld, moet hij worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaredate datum. Die is te vinden op het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaredate.

De zak in buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

De werkzame stoffen in de gebruiksklare mengsel zijn:

bovenste compartiment (glucoseplossing) in 1.000 ml in 625 ml in 1.250 ml in 1.875 ml

Glucosemonohydraat 158,4 g 99,0 g 198,0 g 297,0 g

equivalent aan glucose 144,0 g 90,0 g 180,0 g 270,0 g

Naatriumwaterstofafdisulfatdihydraat 2.496 g 1.560 g 3.120 g 4.680 g

Zinkcitraatdihydraat 7.024 mg 4.390 mg 8.780 mg 13.177 mg

middenste compartiment (metametacetaat) in 1.000 ml in 625 ml in 1.250 ml in 1.875 ml

Succinonzuur, monohydraat 20,00 g 12,00 g 20,00 g 30,00 g

Succinonzuur, granaatfeer 16,000 g 10,000 g 20,000 g 30,000 g

Omega-3-zuur-triglycerideën 4.000 g 2.500 g 5.000 g 7.500 g

onderste compartiment (aminozuroplossing) in 1.000 ml in 625 ml in 1.250 ml in 1.875 ml

Isoleucine 3.284 g 2.053 g 4.105 g 6.158 g

Leucine 4.384 g 2.740 g 5.480 g 8.220 g

Lysine, hydrochloride 3.280 g 2.480 g 3.975 g 4.745 g

equivalent aan lysine 3.188 g 2.191 g 3.482 g 5.130 g

Metionine 2.736 g 1.710 g 3.420 g 5.130 g

Fenylalanine 4.916 g 3.073 g 6.145 g 9.218 g

Treonine 2.540 g 1.581 g 3.175 g 4.763 g

Itryptofaan 0.800 g 0.500 g 1.000 g 1.500 g

Valine 3.604 g 2.243 g 4.402 g 6.727 g

Arginine 3.783 g 2.363 g 4.725 g 7.088 g

Histiidinehydrochloride-monohydraat 2.368 g 1.480 g 2.960 g 4.440 g

equivalent aan histidine 1.753 g 1.095 g 2.191 g 3.286 g

Alanine 6.792 g 4.245 g 8.490 g 12.73 g

Dit geneesmiddel kan ook de volgende bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Indien een van de volgende bijwerkingen optreedt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts; hij/zij zal dit geneesmiddel bij u stopzetten:

Zoals kom voor bij kinderen dan 1 op de 100 gebruikers:

- misselijkheid, braken, verminderde eetlust

Zoals kom voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers:

- allergeen反応
- bloedverzuim
- huidontstekingen
- zwelling of huidaandoeningen

Andere bijwerkingen zijn:

Sans kom voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers:

- misselijkheid, braken, verminderde eetlust

Sans kom voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers:

- allergeen反応
- bloedverzuim
- huidontstekingen
- zwelling of huidaandoeningen

De volgende bijwerking

