

Glucose 20% B. Braun, oplossing voor infusie

Glucose monohydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Beware deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hijzelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Glucose 20% B. Braun en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Glucose 20% B. Braun niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Glucose 20% B. Braun?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glucose 20% B. Braun?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Glucose 20% B. Braun en waarvoor wordt het gebruikt?

Glucose 20% B. Braun is een oplossing die glucose bevat voor toediening in eenader (intraveneuze infusie). U krijgt dit geneesmiddel toegediend om u te voorzien van koolhydraten als u niet in staat bent om normaal te kunnen eten en drinken.

U kunt dit ook toegediend krijgen om een abnormaal lage bloedsuikerspiegel te verhogen.

2. Wanneer mag u Glucose 20% B. Braun niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u het volgende heeft:
 - een te hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) die meer dan 6 eenheden insuline per uur vereist om onder controle te houden
 - delirium trekkens geassocieerd met ernstig vochttekort
 - ernstig verstoord bloedcirculatie, zoals toestanden van shock en circulatoire collage
 - hoge concentraties zuren in uw bloed (acidose)
 - te veel water in uw lichaam
 - water in uw longen
 - acute hartfalen

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glucose 20% B. Braun?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u Glucose 20% B. Braun gebruikt:

Uw arts zal er rekening mee houden als u lijdt aan een acute aandoening, metpijn, postoperatieve stress, infecties, brandwonden, aandoeningen van het zenuwstelsel, het hart, de lever en de nieren, en indien u geneesmiddelen gebruikt die het effect van vasopressine (een hormoon dat het lichaamsvochtvolume reguleert) versterken, vermits, indien u Glucose 20% B. Braun krijgt, u een bijzonder risico loopt op abnormaal lage natriumconcentratie in het bloed (acute hyponatriëmie), wat kan leiden tot zwelling van de hersenen (encefalopathie).

In het bijzonder kinderen, vrouwen in de vruchtbare leeftijd en patiënten met ernstige hersenandoeningen zoals meningoïtis (infectie van de hersenvliezen) of hersenschade lopen een bijzonder risico op ernstige en levensbedreigende zwelling van de hersenen door een acute daling van de natriumconcentratie in het bloed.

U mag dit geneesmiddel niet toegediend krijgen als u (onlangs) een beroerte heeft (gehad), tenzij uw arts dit essentieel acht voor uw herstel.

Uw bloedsuikerspiegel en de concentraties van lichaamsvocht, elektrolyten (vooral kalium) en zuur-base balans worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze correct zijn vóór en tijdens de infusie. Daarom zullen er een kleine hoeveelheden bloed bij u afgenomen worden. Zo nodig zal uw bloedsuikerspiegel onder controle gehouden worden door toediening van insuline.

Voor u dat dit geneesmiddel toegediend krijgt, moeten bestaande stoornissen van het vocht- en zoutgehalte in uw lichaam gecorrigeerd worden, zoals:

- een te lage kalium- of natriumspiegel in uw bloed (hypokaliëmie, hyponatriëmie)
- watertekort en overmatig verlies van zouten

Uw arts zal zeer zorgvuldig afwegen of dit geneesmiddel geschikt is voor u als u het volgende heeft:

- diabetes of elke andere koolhydraatin tolerantie
- een te hoog bloedvolume
- elke stofwisselingstoornis (bv. na operaties of letsets, met te weinig zuurstof in uw weefsels, of met sommige orgaanafwijkingen) waarbij uw bloed zuur kan worden
- abnormaal geconcentreerd bloedserum (hoge serumosmolariteit)
- verstoerde werking van de nieren of het hart.

Uw arts zal extra zorgvuldig te werk gaan als uw bloed-hersenbarrière beschadigd is, omdat dat dit geneesmiddel de druk in uw schedel of ruggengang kan verhogen. Er zal gezorgd worden voor de gepaste toevier van zouten (vooral kalium, magnesium, fosfaat) en vitamineen (vooral vitamine B₁).

Kinderen

Bij toediening van dit geneesmiddel aan kinderen in het eerste en tweede levensjaar zal extra zorgvuldig te werk gegaan worden, omdat een plotselinge stopzetting van hoge infusiesnelheden kan leiden tot een sterke daling van de suikerspiegel, vooral bij deze kinderen.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik u naast Glucose 20% B. Braun oplossing voor infusie nog andere genees middelen, of heeft u dat kort geteld? Indien u bestaat dat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt vooral voor de volgende geneesmiddelen die het effect van vasopressine en het risico op een lage natriumconcentratie (hyponatriëmie) verhogen:

- carbamazepine en oxcarzapine, gebruikt voor de behandeling van epilepsie;
 - vincristine en ifosamide, gebruikt als kankerbehandeling;
 - cyclofosfamide om kanker en auto-immunziekten te behandelen;
 - selectieve serotoninheropnemers (SSRIs) om depressie te behandelen;
 - antipsychotica voor psychische stoornissen;
 - opioïde pijnstillers om ernstige pijn te verlichten;
 - niet-steroidale ontstekingsremmers (NSAIDs) om lichte tot matige pijn te verlichten en om ontsteking in uw lichaam te behandelen;
 - desmopresine voor de behandeling van diabetes insipidus (extreme dorst en voortdurende aanname van grote hoeveelheden verdunne urine);
 - oxytocine, gebruikt tijdens de bevalling;
 - vasopressine en terlipressine, gebruikt voor de behandeling van "slakdarmspataaderbloeding" (vergrote aders in uw slakdarm als gevolg van leverproblemen);
 - diuretica of plasmiddelen (geneesmiddelen die de hoeveelheid urine die u uitscheidt, verhogen).
- Uw arts zal erop letten dat er alleen geneesmiddelen of hulpstoffen aan de oplossing worden toegevoegd die er goed mee mengen.

Erytrocytconcentraat wordt niet aan deze oplossing toegevoegd en wordt ook niet samen met, direct vóór of na bloed via dezelfde slangen toegediend.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Uw arts zal zorgvuldig afwegen of u deze oplossing toegediend mag krijgen als u zwanger bent. Uw bloedsuikerspiegel zal gecontroleerd worden wanneer u dit geneesmiddel krijgt.

Borstvoeding

Uw arts zal zorgvuldig afwegen of u deze oplossing toegediend mag krijgen als u borstvoeding geeft.

Vrouwbaarheid

Geen speciale voorzorgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft onbeduidend of geen invloed op het vermogen voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

3. Hoe gebruikt u Glucose 20% B. Braun?

De hoeveelheid Glucose 20% B. Braun die u toegediend krijgt, wordt bepaald door uw arts, afhankelijk van uw toestand.

Dosering

Voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar is de maximale hoeveelheid 30 ml per kg lichaamsgewicht per dag.

De oplossing zal u niet sneller dan met een infusiesnelheid van 1,25 ml per kg lichaamsgewicht per uur worden toegediend.

Voor kinderen tot en met 14 jaar wordt de maximale dagelijkse hoeveelheid van dit geneesmiddel bepaald volgens de leeftijd en het lichaamsgewicht.

Premature baby's:	90 ml per kg lichaamsgewicht
Pasgeboren:	75 ml per kg lichaamsgewicht
1e - 2e levensjaar:	75 ml per kg lichaamsgewicht
3 - 5 jaar:	60 ml per kg lichaamsgewicht
6 - 10 jaar:	50 ml per kg lichaamsgewicht
11 - 14 jaar:	40 ml per kg lichaamsgewicht

Bij de bepaling van de dosis wordt er rekening gehouden met de totale dagelijkse hoeveelheid, volgens de algemene aanbevelingen voor kinderen:

1e levensdag:	60 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensdag:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
3e levensdag:	100 - 130 ml per kg lichaamsgewicht
4e levensdag:	120 - 150 ml per kg lichaamsgewicht
5e levensdag:	140 - 160 ml per kg lichaamsgewicht
6e levensdag:	140 - 180 ml per kg lichaamsgewicht

1e maand, vóór ingaan van stabiel groeiem tempo:	140 - 170 ml per kg lichaamsgewicht
1e maand, bij stabiel groeiem tempo:	140 - 160 ml per kg lichaamsgewicht
2e tot 12e levensmaand:	120 - 150 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensjaar:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
3 - 5 jaar:	80 - 100 ml per kg lichaamsgewicht
6 - 12 jaar:	60 - 80 ml per kg lichaamsgewicht
13 - 18 jaar:	50 - 70 ml per kg lichaamsgewicht

Bij de bepaling van de dosis wordt er rekening gehouden met de totale dagelijkse hoeveelheid, volgens de algemene aanbevelingen voor kinderen:

1e levensdag:	60 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensdag:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
3e levensdag:	100 - 130 ml per kg lichaamsgewicht
4e levensdag:	120 - 150 ml per kg lichaamsgewicht
5e levensdag:	140 - 160 ml per kg lichaamsgewicht
6e levensdag:	140 - 180 ml per kg lichaamsgewicht

Bij de bepaling van de dosis wordt er rekening gehouden met de totale dagelijkse hoeveelheid, volgens de algemene aanbevelingen voor kinderen:

1e levensdag:	60 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensdag:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
3e levensdag:	100 - 130 ml per kg lichaamsgewicht
4e levensdag:	120 - 150 ml per kg lichaamsgewicht
5e levensdag:	140 - 160 ml per kg lichaamsgewicht
6e levensdag:	140 - 180 ml per kg lichaamsgewicht

Bij de bepaling van de dosis wordt er rekening gehouden met de totale dagelijkse hoeveelheid, volgens de algemene aanbevelingen voor kinderen:

1e levensdag:	60 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensdag:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
3e levensdag:	100 - 130 ml per kg lichaamsgewicht
4e levensdag:	120 - 150 ml per kg lichaamsgewicht
5e levensdag:	140 - 160 ml per kg lichaamsgewicht
6e levensdag:	140 - 180 ml per kg lichaamsgewicht

Bij de bepaling van de dosis wordt er rekening gehouden met de totale dagelijkse hoeveelheid, volgens de algemene aanbevelingen voor kinderen:

1e levensdag:	60 - 120 ml per kg lichaamsgewicht
2e levensdag:	80 - 120 ml per kg lichaamsgewicht

Conditions particulières

Si vous avez une perturbation de votre métabolisme (par exemple, après des opérations ou des blessures, si vous avez trop peu d'oxygène dans vos tissus, ou si vous souffrez de certaines maladies organiques), votre dosage de glucose sera adapté pour maintenir la glycémie proche des valeurs normales.

Mode d'administration

La solution vous sera administrée par un petit tube inséré dans une veine (par perfusion intraveineuse).

Dans le cadre d'une alimentation par intraveineuse, vous recevez également d'autres nutriments comme des acides aminés pour la production de protéines, des emulsions lipidiques, des acides gras dits essentiels, des sels, des vitamines, et des oligo-éléments, si nécessaire.

On utilisera, si possible, une pompe à perfusion pour vous administrer cette solution.

Si vous avez reçu plus de Glucose 20% B. Braun que vous n'en aviez pas

Le cas est peu susceptible de se produire puisque c'est votre médecin qui fixera vos doses quotidiennes.

Compte tenu du risque de concentration anormalement faible de sodium dans votre sang (hyponatrémie), votre médecin contrôlera l'équilibre chimique et hydrique ainsi que les taux de glucose et d'électrolytes (y compris le sodium) dans votre sang, avant et pendant le traitement, en particulier chez les patients chez qui la libération de vasopressine (une hormone qui régule le volume de liquide dans l'organisme) est perturbée et chez les patients qui prennent des médicaments qui renforcent l'action de la vasopressine.

Un surdosage peut se traduire par des taux de glucose trop élevés dans le sang, des pertes de glucose par les urines, des troubles corporels anormalement concentrés, un déficit en liquides, des troubles de la conscience ou une perte de connaissance dus à des taux de glucose extrêmement élevés dans le sang ou à des liquides corporels trop concentrés, un excès de liquide dans l'organisme avec une tension cutanée accrue, une congestion veineuse (flouissement et gonflement des jambes), gonflement des tissus (éventuellement avec de l'eau dans les poumons ou un gonflement du cerveau) et des niveaux d'électrolytes sanguins anormalement élevés ou bas.

Un surdosage extrême peut également entraîner une accumulation de lipides dans le foie.

Si tel est le cas, votre perfusion de glucose sera ralenti ou arrêtée.

Votre médecin évaluera le traitement dont vous aurez alors besoin, notamment l'administration d'insuline, de liquide ou de sels.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Glucose 20% B. Braun, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquence indéterminée (*ne peut être estimée sur la base des données disponibles*):

- La concentration de liquide et de certains minéraux dans votre organisme peut être déséquilibrée. Les concentrations de sodium (hyponatrémie), de potassium, de phosphate et de magnésium dans votre sang peuvent diminuer.

Une concentration anormalement basse de sodium dans votre sang peut provoquer une affection grave appelée hypotonie hypotonique, qui peut elle-même provoquer des lésions cérébrales irréversibles et entraîner la mort à la suite d'un œdème cérébral (encéphalopathie hypotonique aiguë). Les symptômes de l'œdème cérébral sont, notamment, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des convulsions, de la fatigue et un manque d'énergie.

- Réactions locales à l'heure du site d'injection telles que douleur, irritation des veines, thrombophlébite et nécrose des tissus à la suite d'une extravasation.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou - site internet: www.notifierneffetindesirable.be

- e-mail : adr@afmps.be.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Glucose 20% B. Braun

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

6. Contenu de l'emballage et autres informations**Ce que contient Glucose 20% B. Braun**

• La substance active est le glucose monohydraté.

Le médicament contient 220 g de glucose monohydraté, soit 200 g de glucose par litre.

DE – Gebrauchsinformation: Information für Anwender

B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen, Deutschland

Glucose 20% B. Braun, Infusionslösung

Glucosemonohydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

• Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

• Wenn Sie nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Glucose 20% B. Braun und wofür wird es angewendet?

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Glucose 20% B. Braun beachten?

3. Wie ist Glucose 20% B. Braun anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist Glucose 20% B. Braun aufzubewahren?

Glucose 20% B. Braun ist eine Lösung, die Glucose enthält und in eine Vene (intravenöse Infusion) zugeführt wird.

Dieses Arzneimittel wird Ihnen verabreicht, um Ihnen Kohlenhydrate zuzuführen, wenn Sie nicht in der Lage sind, ausreichend zu essen und zu trinken.

Es kann auch gegeben werden, um einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel anzuheben.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Glucose 20% B. Braun beachten?**Sie werden Glucose 20% B. Braun nicht erhalten,**

wenn Sie

• allergisch gegen Glucose oder einer der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

• einen zu hohen Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) haben, der erst auf Insulingaben von mehr als 6 Einheiten pro Stunde anspricht.

• an einem Delirium Tremens in Verbindung mit einem schweren Flüssigkeitsmangel leiden

• an einer schweren Beeinträchtigung Ihres Kreislaufs wie z.B. einem Schockzustand oder einem Kreislaufkollapse leiden

• an einem erhöhten Spiegel an sauren Substanzen im Blut (einer Azidose) leiden

• zu viel Wasser im Körper haben

• Wasser in den Lungen haben

• an einer akuten Herzschwäche (Herzinsuffizienz) leiden.

Warinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Glucose 20% B. Braun anwenden.

Ihr Arzt wird dies berücksichtigen, wenn Sie an einer akuten Erkrankung mit Schmerzen, postoperativem Stress, Infektionen, Brandwunden, Erkrankungen des Nervensystems oder einer Herz-, Leber- und Nierenkrankung leiden und wenn Sie Arzneimittel verwenden, die die Wirkung von Vasopressin (einem Hormon, das das Körperfüssigkeitsvolumen reguliert) erhöhen. Wenn Sie Glucose 20% B. Braun anwenden, ist die Gefahr nämlich besonders groß, dass die Natriumkonzentration im Blut normal stark gesenkt werden (akute Hypotonie), was zu einer Hirnschwellung (Enzephalopathie) führen kann.

Insonder bei Kindern, Frauen im fruchtbaren Alter und Patienten mit schweren Hirnerkrankungen wie Meningitis (Hirnhautinfektion) oder Hirnschäden ist die Gefahr einer schweren und lebensbedrohlichen Hirnschwellung durch eine akute Senkung der Natriumkonzentration im Blut besonders groß.

Sie sollten dieses Arzneimittel normalerweise nicht erhalten, wenn Sie einen Schlaganfall vor kurzem erlitten haben, es sei denn, Ihr Arzt hält für Ihre Genesung für zwingend erforderlich.

Ihr Blutzuckerspiegel, Ihr Flüssigkeitshaushalt, Ihre Elektrolyte (insbesondere Kalium) sowie Ihr Säure-Basis-Hausstand werden überprüft, um sicherzustellen, dass diese Werte sich vor und während der Infusion im Normbereich befinden. Hierfür werden Ihnen Blutproben abgenommen. Bei Bedarf wird ihr Blutzuckerspiegel durch Insulingaben eingestellt.

Bevor Sie dieses Arzneimittel erhalten, müssen vorbestehende Störungen des Flüssigkeitss- und Salzgehalts in Ihrem Körper korrigiert werden. Hierzu zählen z.B.:

• Zu niedriger Kalium- oder Natrumeinhalt in Ihrem Blut (Hypokaliämie, Hypotonie)

• Wassermangel oder ein ausgeprägter Salzverlust.

Ihr Arzt wird sorgfältig überprüfen, ob dieses Arzneimittel für Sie geeignet ist, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

• Diabetes oder jede Art von Unverträglichkeit gegenüber Kohlenhydraten

• Hohes Blutvolume

• Beeinträchtigungen Ihres Stoffwechsels (z.B. nach Operationen oder Verletzungen, bei einem vermindernden Sauerstoffgehalt in Ihren Geweben oder bei bestimmten Organerkrankungen), die zu einer Übersäuerung Ihres Blutes führen können

• Abnorm hoher Gehalt an gelösten Aderen im Blutserum (hohe Serumsosmolarität)

• Einschränkung Ihrer Nieren- oder Herzleistung.

Ihr Arzt wird Sie besonders sorgfältig überwachen, wenn Sie an einer Schädigung der Blut-Hirn-Schranke leiden, da dieses Arzneimittel in solchen Fällen zu einem Druckanstieg in Ihrem Schädel oder Ihrem Rückenmarkkanal führen kann.

Eine angemessene Zufuhr an Salzen (insbesondere Kalium, Magnesium, Phosphat) und Vitaminen (insbesondere Vitamin B) wird sichergestellt werden.

Kinder

Wird dieses Arzneimittel Kindern im ersten und zweiten Lebensjahr verabreicht, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, da vor allem bei diesen Kindern eine plötzliche Beendigung einer Infusion mit hoher Flussrate zu einem sehr starken Abfall des Blutzuckerspiegels führen kann.

Anwendung von Glucose 20% B. Braun zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Dies gilt vor allem für die folgenden Arzneimittel, die die Wirkung von Vasopressin und das Risiko einer niedrigen Natriumkonzentration (Hypotonie) erhöhen:

• Carbamazepin und Oxcarbazepin zur Epilepsiebehandlung;

• Vinristin und Ifosfamid zur Krebsbehandlung;

• Cyclophosphamid zur Behandlung von Krebs und Autoimmunkrankheiten;

• Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmung (SSRI) zur Behandlung von Depressionen;

• Antipsychotika zur Behandlung psychischer Störungen;

• Opioide Schmerzmittel zur Linderung starker Schmerzen;

• nichtsteroidale Antirheumatik (NSAR), um leichte bis mäßige Schmerzen zu lindern und Entzündungen in Ihrem Körper zu behandeln;

• Desmopressin zur Behandlung von Diabetes insipidus (Erkrankung, die mit extremem Durst und der Produktion von großen Mengen verdünntem Harn einhergeht);

• Oxytocin, das während der Entbindung angewandt wird;

• Vasopressin und Terlipressin zur Behandlung einer „Blutung der Speiseröhre/krempfader“ (vergrößerte Adern in Ihrer Speiseröhre aufgrund von Leberproblemen);

• Diuretika oder hartreibende Mittel (Arzneimittel, die die Harnmenge, die Sie ausscheiden, erhöhen).

Ihr Arzt wird Sie besonders sorgfältig überwachen, wenn Sie an einer Schädigung der Blut-Hirn-Schranke leiden, da dieses Arzneimittel in solchen Fällen zu einem Druckanstieg in Ihrem Schädel oder Ihrem Rückenmarkkanal führen kann.

Eine angemessene Zufuhr an Salzen (insbesondere Kalium, Magnesium, Phosphat) und Vitaminen (insbesondere Vitamin B) wird sichergestellt werden.

Anwendung von Glucose 20% B. Braun zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Dies gilt vor allem für die folgenden Arzneimittel, die die Wirkung von Vasopressin und das Risiko einer niedrigen Natriumkonzentration (Hypotonie) erhöhen:

• Carbamazepin und Oxcarbazepin zur Epilepsiebehandlung;

• Vinristin und Ifosfamid zur Krebsbehandlung;

• Cyclophosphamid zur Behandlung von Krebs und Autoimmunkrankheiten;

• Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmung (SSRI) zur Behandlung von Depressionen;

• Antipsychotika zur Behandlung psychischer Störungen;

• Opioide Schmerzmittel zur Linderung starker Schmerzen;

• nichtsteroidale Antirheumatik (NSAR), um leichte bis mäßige Schmerzen zu lindern und Entzündungen in Ihrem Körper zu behandeln;

• Desmopressin zur Behandlung von Diabetes insipidus (Erkrankung, die mit extremem Durst und der Produktion von großen Mengen verdünntem Harn einhergeht);

• Oxytocin, das während der Entbindung angewandt wird;

• Vasopressin und Terlipressin zur Behandlung einer „Blutung der Speiseröhre/krempfader“ (vergrößerte Adern in Ihrer Speiseröhre aufgrund von Leberproblemen);

• Diuretika oder hartreibende Mittel (Arzneimittel, die die Harnmenge, die Sie ausscheiden, erhöhen).

Ihr Arzt wird Sie besonders sorgfältig darüber entscheiden, ob dieses Arzneimittel für Sie geeignet ist, wenn Sie schwanger sind. Wenn Sie dieses Arzneimittel erhalten, wird Ihr Blutzucker kontrolliert werden.

Stillzeit

Ihr Arzt wird sorgfältig darüber entscheiden, ob dieses Arzne