


Perforaties in steriele verpakte soft wrap, een onzichtbaar risico


Wetenschappelijke informatie



In de Verenigde Staten zijn ongeveer 40% van de infecties postoperatieve wondinfecties (PWI).¹



In lage- en middeninkomenslanden heeft ongeveer 10% van de geopereerde patiënten een PWI.²



De betrouwbaarheid van sterilisatietechnieken voor herbruikbare instrumenten is van vitaal belang voor het voorkomen van PWI.

Als perforaties in steriele soft wraps worden **ontdekt**, kan de impact op het ziekenhuis aanzienlijk zijn.




Uitgestelde of geannuleerde operatie



Financiële gevolgen door de hersterilisering van instrumenten



Langere duur van de anesthesie van de patiënt




Lagere tevredenheid bij het zorgpersoneel

Als perforaties in steriele soft wraps **NIET** worden **geïdentificeerd**, loopt de patiënt risico op blootstelling aan ziekteverwekkers.



Zelfs zeer kleine perforaties kunnen leiden tot een risico op bacteriële besmetting.¹



De besmetting kan worden veroorzaakt door een naald van 1,1 mm.¹

**Ontdek onze oplossing
op de achterkant!**

¹ Waked WR, Simpson AK, Miller CP, Magit DP, Grauer JN. Sterilization wrap inspections do not adequately evaluate instrument sterility. Clin Orthop Relat Res. 2007;462:207-211.

² WHO Protocol for surgical site infection surveillance with a focus on settings with limited resources, 2018; www.who.int/infection-prevention/en.

Ons assortiment containers AESCULAP biedt de optimale oplossing om de veiligheid van je patiënt te garanderen.



Wens je meer informatie, neem dan contact op met Ann Andries
via ann.andries@bbraun.com

Scan de QR-code voor
meer informatie!

